

Übersicht zu den PDE-5-Hemmern

Merkmale	Sildenafil	Tadalafil	Vardenafil
Kinetik:			
Bioverfügbarkeit	41%	nicht bestimmt	15%
Halbwertszeit	terminal: 3 - 5 Std.	median: 17,5 Std.	terminal: 4 - 5 Std.
Nahrungseinfluss	bei gleichzeitigem Verzehr fettreicher Speisen relevant	keine verzögernden Faktoren bekannt	bei gleichzeitigem Verzehr fettreicher Speisen relevant
Einnahme vor dem Geschlechtsverkehr	60 Min.	30 Min. - 12 Std.	25 bis 60 Min.
Wirkung:			
Wirkeintritt	25 Min.	30 Min.	25 Min.
Wirkdauer	4 - 5 Std.	bis 24 Std.	4 - 5 Std.
Wirksamkeit	62 - 82%	72 - 86%	68 - 80%
Nebenwirkungen			
sehr häufig; >10% der Anwender	<ul style="list-style-type: none"> Kopfschmerzen Hautrötungen mit Hitzegefühl (Flush) 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfschmerzen Verdauungsstörungen 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfschmerzen Hautrötungen mit Hitzegefühl (Flush)
häufig; <10% der Anwender	<ul style="list-style-type: none"> Verdauungsstörungen verstopfte Nase Sehstörungen Schwindel 	<ul style="list-style-type: none"> Muskel- und Rückenschmerzen verstopfte Nase Hautrötungen mit Hitzegefühl (Flush) Schwindel 	<ul style="list-style-type: none"> Verdauungsstörungen verstopfte Nase Übelkeit Schwindel
Gegenanzeigen	<ul style="list-style-type: none"> Einnahme von Nitraten bzw. Stickstoffmonoxid (NO)-Donatoren Herz- Kreislauferkrankungen (niederer Blutdruck, künstlicher Herzinfarkt oder Schlaganfall) Ablösung der Netzhaut (nicht bei Tadalafil) 		